

NOTICIERO INFECTOLOGICO SOCHINF COVID-19

05 de julio 2021

Casos COVID-19:

- Esta semana se registraron en promedio 3.368 casos, lo que muestra una disminución de 26,8% en la última semana y 46,7% en los últimos 14 días.
- La disminución mensual de casos activos fue de 51,3%
- La positividad promedio fue de 6,3% con una disminución de 21% esta última semana. Tenemos una tendencia en los últimos 14 días de disminución de positividad (-31,2%), manteniéndonos bajo el umbral del 10% lo que es importante para control de la pandemia.
- El promedio de casos activos también disminuyó esta semana un 24,5%, siendo en promedio 23.608 estos últimos 7 días.
- El número de hospitalizados en UPC se mantiene en promedio 2927 con disminución de 6,6% .

Vacunación SARS-CoV-2

- Se mantiene el programa de vacunación, según calendario.
- Esta semana se inicia la vacunación a adolescentes de 16 y 17 años y se mantiene para adolescentes entre 12 y 17 años de centros SENAME, centros de salud mental y con enfermedades crónicas específicas (incluida obesidad).
- Se mantiene la vacunación de embarazadas y los rezagados de más de 18 años de edad.
- Aún pendiente establecer un refuerzo de vacunación, pero se deberá establecer cuando (más de 6 meses de última dosis) y si con la misma vacuna u otra variedad (refuerzo heterólogo).

Variantes SARS-CoV-2

- Se detectó un tercer caso de variante Delta en Chile esta semana, un lactante cuyos padres llegaron de USA.
- Se mantiene la modificación de la definición de contacto estrecho para esta variante: todo contacto independiente del uso de mascarilla y tiempo, sin incluir personal de salud con EPP adecuada.
- Aumentan el número de reportes científicos sobre la variante Delta estableciendo que su transmisibilidad es casi 4 veces superior (Ro 8-9) a la Wuhan (Ro 2-3) y Alfa (Ro 3-4).
- La variante está afectando más a población joven (menor 25 años) sin embargo, no está claro si es un factor de riesgo o porque es la población menos vacunada.

- Los casos son más frecuentes en población no vacunada que la vacunada.
- Existe un mayor número de casos de reinfección.
- No se ha descrito mayores brotes o casos en personal de salud que utilizan EPP.
- La sintomatología es similar a un resfrió común con coriza, odinofagia y menos fiebre.
- Se recomienda en unidades de urgencias y centros clínicos, volver a solicitar información de viaje internacional en los últimos 14 días al momento de la atención o si han sido contacto estrecho de un viajero

Sociedad Chilena de Infectología

Aporte realizado por Dr. Michel Serri. Directorio Sociedad Chilena de Infectología.